

Дексаметазон, Мильгамму, Байтрил лучше колоть хотя бы с 20 минутным перерывом или в разные лапки. Остальное можете колоть подряд.

день	препарат	дозировка	холка	ножка	рот	частота	дни	комментарии
1	Фенбендазол	20 мг/0, 7мл			+	1 раз в день	28	
2	Дексаметазон	0,2мл		+		1 раз в день		0,2мл(3дня) - 0,15мл(2 дня) - 0,1мл(6дней) - 0,05мл(2 дня)
3	Байтрил 2,5%	0, 5 мл	+	+		1 раз в день	14	
или, если нет5	Комплекс В	2мл	+			1 раз в день	14	колоть, смешивать с глюкозой и рингером
5	Мильгамму	0, 5 мл		+		через день	5-7 раз	смешивать с растворами нельзя, отдельно только колоть.
6	Глицин	1/6 таблетки			+	2 раза в день	31	
7	Линекс	1/4 капсулы			+	1 раз в день	21	
8	раствор Рингера	15мл	+			2 раза в день	31	
9	Глюкозу	5 мл	+			2 раза в день	31	пока не нчанет сама есть
10	Эспумизан	3мл			+	2 раза в день	31	пока не нчанет сама горошить
11	Ветом	1/5 пакетика			+	1 раз в день	5	1/5 разводите в 1мл воды и выпаиваете
12	Локсиком	0,3 мл			+	1 раз в день		пока не нчанет сама горошить
13	Фитолизин	10 мл			+	2 раза в день		Разводится 0,5 чайной ложки на стакан воды
14	Контарен	0,3мл	+	+		2-3 раза в день	10	далее 1 раз в сутки месяц
15	Арутимол	1 капля в глазик				2 раза в день	14	